

Übungsaufgaben zur Vorlesung

Mathematische Methoden für das Lehramt (Ba of Arts)

apl. Prof. Dr. R. Bulla

WS 2018/19

Blatt 6: Abgabetermin: Mittwoch, der 21.11.2018, 10:00

Aufgabe 1: Integration

(6 Punkte)

- a) Berechnen Sie folgendes Integral mit Hilfe partieller Integration ($m \neq -1$):

$$\int_1^a x^m \ln(x) \, dx . \quad (2 \text{ Punkte})$$

- b) Berechnen Sie folgendes Integral mit Hilfe der Substitution $x = a \sin(\alpha)$ (α ist die Substitutionsvariable; es gilt $a > 0$):

$$\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \, dx . \quad (2 \text{ Punkte})$$

- c) Das folgende Integral ergibt eine Funktion, die von dem Parameter x abhängt ($x \neq 0$). Berechnen Sie $f(x)$ mit Hilfe partieller Integration.

$$f(x) = \int_0^x t \sin(xt) \, dt . \quad (2 \text{ Punkte})$$

Aufgabe 2: Integration durch Substitution

(6 Punkte)

- a) Berechnen Sie das folgende Integral mit Hilfe der Substitution $u = \ln(x)$:

$$\int_1^e \frac{1}{x(1 + \ln(x))} \, dx . \quad (2 \text{ Punkte})$$

- b) Berechnen Sie das folgende Integral mit Hilfe der Substitution $u = \cos(x)$ und anschließender Substitution $v = u^2$:

$$\int_0^{\pi/4} \ln(\cos^2(x)) \cos(x) \sin(x) \, dx . \quad (4 \text{ Punkte})$$

Hinweis: $F(v) = v \ln(v) - v$ ist Stammfunktion zu $f(v) = \ln(v)$.

Aufgabe 3: skalare Felder

(4 Punkte)

Betrachten Sie die folgenden skalaren Felder $\varphi_i(\vec{r})$ ($i = 1, 2$) mit $\vec{r} \in \mathbb{R}^2$:

$$\varphi_1(\vec{r}) = xy, \quad \varphi_2(\vec{r}) = \frac{y}{x^2 + 1}.$$


Skizzieren Sie die Höhenlinien der skalaren Felder $\varphi_i(\vec{r})$, also die Linien mit $\varphi(\vec{r}) = \varphi_n$, für eine sinnvolle Auswahl an φ_n .

Aufgabe 4: Vektorfelder

(6 Punkte)

Wie in der Abbildung dargestellt, befinden sich zwei Körper (Masse jeweils M) fest an den Orten

$$\vec{r}_1 = \begin{pmatrix} -a \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{r}_2 = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (a > 0).$$



- a) Wie lautet das Kraftfeld (Gravitationsfeld) $\vec{F}(\vec{r})$, das diese beiden Körper auf einen dritten Körper (Masse m) am Ort \vec{r} ausüben? (2 Punkte)
- b) Berechnen Sie $\vec{F}(\vec{r})$ für $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$. (1 Punkt)
- c) Berechnen Sie $\vec{F}(\vec{r})$ für $\vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix}$. (1 Punkt)
- d) Skizzieren Sie das Kraftfeld $\vec{F}(\vec{r})$. (2 Punkte)