Mathematische Methoden – Blatt 2

Wintersemester 2021/22

Webpage: http://www.thp.uni-koeln.de/~rk/mathmeth_21.html/
https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_crs_4280631.html

Abgabe: Dienstag, den 02.11.2021, 23:59 Uhr

5. Zur Diskussion

0 Punkte

- Was ist ein Skalarprodukt? Was sind dessen definierende Eigenschaften?
- Wann sind zwei Vektoren orthogonal?
- Wie bestimmt man die Norm eines Vektors? Wie bestimmt man den Winkel zwischen zwei Vektoren?
- Was ist eine Orthonormalbasis (ONB)?
- Wie ist das Vektorprodukt definiert?

6. Skalarprodukt

1+3+2+1=7 Punkte

- Finden Sie heraus, wie der Kosinussatz lautet und geben Sie diesen hier an.
- Beweisen Sie den Kosinussatz mithilfe des Skalarprodukts. Als Inspiration diene die nebenstehende Skizze.

- Seien a und b nun die Kantenlängen eines Parallelogramms, e und f die Längen der Diagonalen. Verfahren Sie analog zu Aufgabenteil **b)**, um $e^2 + f^2 = 2(a^2 + b^2)$ zu zeigen.
- Zeigen Sie schließlich, dass die Diagonalen eines gleichseitigen Parallelogramms ($a = b$) senkrecht zueinander sind.

7. Vektoren und Basisdarstellung

1+4+5+3=13 Punkte

Gegeben seien die Vektoren $\vec{u}$ und $\vec{v}$ mit Komponenten u_1, u_2, u_3 und v_1, v_2, v_3 bezüglich einer Orthonormalbasis (ONB) $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$.

- Stellen Sie $\vec{u}$ als Linearkombination von $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ und $\vec{e}_3$ dar.
- Zeigen Sie, dass folgendes gilt:

- $u_i \equiv \langle \vec{e}_i, \vec{u} \rangle$.
- $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \equiv \sum_{i=1}^3 u_i v_i$.
- $|\vec{u}| \equiv \sqrt{\sum_{i=1}^3 u_i^2}$.

Gegeben seien außerdem die Vektoren $\vec{f}_1 := \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2)$, $\vec{f}_2 := \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{e}_1 - \vec{e}_2)$ und $\vec{f}_3 := \vec{e}_3$.

c) Zeigen Sie, dass es sich bei $B' := (\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3)$ ebenfalls um eine ONB handelt.

d) Berechnen Sie für die beiden nebenstehenden Vektoren die Darstellung in B' .

(Tipp: Benutzen Sie Aufgabenteil b).)

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}_B \quad \text{und} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}_B$$

8. Flächen und Volumen mit dem Vektorprodukt $2+3+3+2=10$ Punkte

a) Bestimmen Sie den Flächeninhalt dieses Parallelogramm mithilfe des Vektorproduktes.

b) Zeigen Sie, dass das Volumen eines durch drei Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$ aufgespannten Tetraeders gegeben ist durch $V = \frac{1}{6} |\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{w} \rangle|$.

(Tipp: Man kann das Volumen eines Tetraeders bestimmen durch $\frac{1}{3} \cdot \text{Grundfläche} \cdot \text{Höhe}$.)

c) $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ sei eine ONB. Betrachten Sie zwei Tetraeder, einen aufgespannt durch $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ und $\vec{e}_3$, und den anderen durch $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ und $\frac{1}{3}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3)$. Skizzieren Sie die beiden Tetraeder, und berechnen Sie deren Volumen.

d) Argumentieren Sie geometrisch, dass $|\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{w} \rangle| = |\langle \vec{w} \times \vec{u}, \vec{v} \rangle| = |\langle \vec{v} \times \vec{w}, \vec{u} \rangle|$.